

# Ernährung von Körnerfressern, Teil 1

(z.B. Haus- und Feldsperlinge, Buchfinken,  
Kernbeißer, Dompfaffe, Ammern, Zeisige)

(für die Ernährung von Grünfink, Stieglitz, Girlitz und Hänfling s. Teil 2: Vegetarier)



junger Haussperling an der Kolbenhirse

## Grundsätzliches:

Erwachsene Sperlinge und Buchfinken ernähren sich in erster Linie von Getreide, Gras- und Wildkräutersamen, Zeisige von kleinen Baumsamen (z.B. Erle, Birke) und Nüssen, Kernbeißer von größeren Baumsamen (z.B. Buche, Ahorn, Kirsche, Zwetschge), Früchten und Nüssen. Ab und an werden von den genannten Arten Insekten gefressen. Ammern fressen im Sommer v.a. Insekten und im Winter Samen. An die Nestlinge werden fast ausschließlich Insekten verfüttert, im Ästlingsalter enthält die Nahrung einen steigenden vegetarischen Anteil.

## Unbefiederte, blinde Nestlinge (1.-7. Lebenstag):

**frischtote** Insekten: Heimchen, Pinkies, Fliegen, Buffalos, Steppengrillen, Drohnen, Wachsmottenlarven, usw.

Ein Brei aus diesen Insekten und **Hand**aufzuchtsfutter (Nutribird A21) durch eine 1ml-Spritze ohne Nadel oder mit einem Spatel geben. Pro Mahlzeit können je nach Alter etwa 0,1 bis 0,3 ml gefüttert werden. Zusätzliche Wassergaben sind nicht nötig.

## Befiederte Nestlinge:

Nahrung wie bisher. Insekten (**frischtot oder aufgetaut**) können jetzt im ganzen (**Heimchen und Grillen ohne Beine!**) mit einer stumpfen Pinzette gereicht werden, zusätzlich wird ein Insekt täglich mit etwas Korvimin ZVT eingestäubt.

**Ästlinge:**

Absetzen des Handaufzuchtfutters, zusätzlich zu Insekten (die noch den Hauptteil der Nahrung bilden) und Korvimin ZVT werden die Jungvögel mit vegetarischem Futter versorgt, das nach und nach auf einen Anteil von 1/3 gesteigert wird. Geeignet sind anfangs vor allem frische Keimlinge, später auch zerkleinerte halbreife Samen von ungespritztem Getreide, Gräsern und Wildkräutern \*, Mehrkornflocken und geschälte zerkleinerte Hirsekörner. Diese Zutaten werden angefeuchtet und per Spatel oder Pinzette gefüttert. Einmal täglich wird eine kleine Prise Grit zugegeben. Als gesunde Nahrungsergänzung sind Bienenpollen sowie Gersten- und Weizengraspulver und Spirulina geeignet.

Mit etwa 2,5 Wochen fangen die Tiere an, selbst zu picken. Das bisherige Futter wird jetzt auch aus Schüsseln gereicht, zusätzlich werden lebende Insekten wie Buffalos und kleine Mehlwürmer angeboten und Sträußchen mit Wildkräutern und -gräsern sowie Kolbenhirse an den bevorzugten Sitzplätzen aufgehängt. Wassernäpfe zum Trinken und zum Baden sowie eine Schüssel mit Grit müssen immer zur Verfügung stehen. Haus- und Feldsperlinge benötigen auch ein Sandbad.

**Solange gebettelt wird, muss weiter zugefüttert werden**, die Fütterung per Hand wird aber nach und nach eingestellt. Trinkwasser auf dem Boden und eine Schüssel zum Baden anbieten (flache Schale, 1-2 cm Wasserspiegel).

Gewicht täglich kontrollieren (hier empfiehlt sich eine Art Pflage tagebuch).



Futtermischung für die Fütterung per Pinzette und zum Selberpicken

**selbstständig fressende Jungvögel:**

Vor der Auswilderung müssen Körnerfresser lernen, Samen selbst zu schälen. Dazu wird ein steigender Anteil zunächst angeknackter, später komplett ungeschälter Sämereien (z.B. Waldvogelfutter) gefüttert. Die Jungvögel müssen außerdem ihre arttypische Nahrung kennen, z.B. Getreide, Gräser, Wildkräuter sowie evtl. Äste mit Baumsamen, Steinobst und Nüssen (über das Nahrungsspektrum der jeweiligen Art nachlesen).

\* sehr gut geeignet und bei den jungen Körnerfressern beliebt sind z.B. die Samenstände von Vogelmiere, Brennnessel, Löwenzahn, Spitz- und Breitwegerich, Flohknöterich, Borsten- und Hühnerhirse, Kamille, Beifuß. Außerdem dürfen alle einheimischen Wildgräsersemen verfüttert werden.

Facebookgruppe Wildvogelhilfe