

Ernährung von drosselartigen Vögeln

(Amseln, Drosseln, Stare)

Grundsätzliches:

Die erwachsenen drosselartigen Vögel ernähren sich mit gemischter Nahrung. Dazu gehören vor allem Insekten, Würmer, Schnecken, Obst (Beeren, Kirschen, mürbes Fallobst) und in den Wintermonaten auch Fettfutter am Futterhaus. Sie nehmen für ihre Verdauung auch Erde auf. Heilerde ist in der frühen Kükenaufzucht ein gesunder Ersatz.

Unbefiederte, blinde Nestlinge:

ausschließlich frischtote Insekten: Heimchen, Pinkies (nur zusätzlich abgekocht), Fliegen, Buffalos, Steppengrillen, Drohnenbrut (nur zusätzlich abgekocht), Wachsmottenlarven, Schokoschaben, Soldatenfliegenlarven. Entweder kleine Tiere (bis 1cm) verfüttern oder einen Brei aus diesen Insekten durch eine 1 ml Spritze ohne Nadel mit abgeschnittenem Konus (über einem Feuerzeug die scharfen Schnittkanten runden) geben (1. Bis 7. Lebenstag). Insekten enthalten ausreichend Flüssigkeit, so dass eine zusätzliche Wassergabe nicht nötig ist.

Befiederte Nestlinge:

Nur noch ganze frischtote Futterinsekten mit einer stumpfen Pinzette reichen, größtmäßig dem Wachstum des Kükens angepasst. Zusätzlich ein Insekt täglich mit Korvimin ZVT panieren, um die Mineral-, Vitamin- Aminosäuren- und Spurenelementversorgung zu gewährleisten.

Bisheriges Nahrungsspektrum erhalten und erweitern durch Mehlwürmer (weiße, frisch gehäutet), Zophobas, langsame Gewöhnung an kleine Stückchen Obst oder kleine Beeren.



© Monika Löffler-Friedrich

Amsel Nestling

Ästlinge:

In der Bettflugphase wird das bisherige Futter per Handfütterung beibehalten. Zusätzlich kann daneben ein Weichfresserfutter **OHNE** Bäckereierzeugnisse z.B. von orlux Insectpatee als Standfutter in der Schale auf dem Boden angeboten werden, das mit frischtoten Insekten, Obst und lebenden Mehlwürmer vermischt wird. Der Vogel lernt schnell eigenständig zu picken. Schnabelfütterung dem Verhalten des Tieres angepasst ausschleichen. **So lange die Bettflugphase andauert, weiter zufüttern.** Trinkwasser auf dem Boden und eine Schüssel zum Baden anbieten (flache Schale, 1-3 cm Wasserspiegel).

Kurz vor Auswilderung Insekten in Laubhaufen verstecken und ganze Früchte reichen, diese muss der Vogel selbstständig zerteilen und fressen können, Beeren am Strauch zum selber Picken anbieten.



Wächolderdrossel



Star hinten, Amsel vorne